

Recombinant Hirudin

Hirudine recombinante

Vial of $\approx 160,000$ ATU / flacon de $\approx 160\,000$ ATU (RE120B)
(Bulk/Vrac) RE120Z

RE120B / RE120Z

STORE AT
2-8°C

For research use only.
Not for use in diagnostic procedures

Uniquement à usage de recherche.
Ne pas utiliser à des fins de
diagnostic.

CONSERVER A
2-8°C

Origin:

Recombinant protein

Presentation:

Vial containing about 160,000 ATU of rec-Hirudin.

This specification is based on the hirudin anti-thrombin activity expressed in ATU*.

Reconstitution:

Restore the vial with 1 ml of distilled water. When restored, the solution contains a rec-Hirudin solution with an activity of approximately 160,000 ATU*/ml.

The measured recombinant hirudin activity is given for each lot on the Certificated of Analysis.

Excipients:

- Glycine, Hepes, Sodium Chloride, **pH 7.50**

Activity:

Hirudin has an activity of about 160,000 ATU*/vial.

Use:

For in vitro use only.

For research use only (RUO)

Thrombin inhibitor, which can be used in any in vitro laboratory research application where an efficient inhibition of Thrombin is required.

Stability:

Restored :

- 2 days at room temperature
- 7 days at 2-8°C
- 6 months frozen at -20°C or below

Lyophilized :

- Until the expiration date printed on the vial.

*ATU: Anti Thrombin Unit

This kit is for research use only and should not be used for patient diagnosis or treatment. The results obtained should be for research purposes only and not used for patient diagnosis or treatment.

Origine :

Protéine recombinante

Présentation :

Flacon contenant environ 160 000 ATU d'hirudine recombinante.

Cette spécification est basée sur l'activité anti-thrombine de l'hirudine exprimée en ATU *.

Reconstitution:

Chaque flacon doit être reconstitué par 1 ml d'eau distillée. Après reconstitution la solution obtenue contient une solution d'hirudine recombinante avec une activité d'approximativement 160 000 ATU*/ml.

L'activité mesurée de l'hirudine recombinant est indiquée pour chaque lot sur le certificat d'analyse.

Excipients :

- Glycine, Hépes, chlorure de sodium, **pH 7.50**.

Activité :

L'Hirudine possède une activité d'environ 160 000 ATU*/flacon.

Utilisation :

Utilisation *in vitro* exclusivement.

Uniquement à usage de recherche

Inhibiteur de la Thrombine pouvant être utilisé dans toutes les applications de recherche in vitro, au laboratoire.

Stabilité du flacon:

Reconstitué :

- 2 jours à température ambiante
- 7 jours à 2-8°C
- 6 mois congelé à -20°C ou en deçà.

Lyophilisé :

- Jusqu'à la date d'expiration imprimée sur le flacon.

*ATU: Anti Thrombin Unit

Ce kit est destiné à la recherche uniquement et ne doit pas être utilisé pour le diagnostic ou le traitement des patients. Les résultats obtenus devraient être à des fins de recherche uniquement et ne doivent pas être utilisés pour le diagnostic ou le traitement des patients.